

Uvéite récidivante équine (URE)

Inflammation intraoculaire récidivante chez le cheval

L'uvéite récurrente équine (ERU) est une inflammation intraoculaire chronique, récidivante et à médiation immune. Elle constitue la cause la plus fréquente de cécité chez le cheval et nécessite une prise en charge spécialisée précoce.

Qu'est-ce que l'ERU ?

Lors d'ERU, des épisodes inflammatoires répétés touchent les structures internes de l'œil (iris, corps ciliaire, choroïde). La maladie est le plus souvent unilatérale, mais peut également affecter les deux yeux. Entre les crises, l'œil peut paraître cliniquement normal.

Causes

- Prédisposition génétique (fréquente chez les chevaux à robe appaloosa, mais aussi dans d'autres races)
- Séquelles tardives d'une infection antérieure à la Leptospirose avec réaction auto-immune secondaire

Formes d'ERU

ERU classique : inflammation marquée et douloureuse du segment antérieur.

ERU insidieuse : inflammation du segment postérieur, souvent peu symptomatique pendant longtemps.

Symptômes typiques

Larmolement ou rougeur oculaire, blépharospasme (clignement excessif des paupières), photophobie, myosis, opacification de l'œil. Au cours de l'évolution, des opacités du cristallin, des modifications de la couleur de l'iris et une perte de vision peuvent apparaître.

Diagnostic

Le diagnostic repose sur un examen ophtalmologique spécialisé. Pour déterminer l'étiologie, une analyse de l'humeur aqueuse ou du vitré est souvent nécessaire.

Remarque importante concernant le diagnostic : une opacité du cristallin (cataracte) ou du vitré n'indique pas automatiquement une uvéite récurrente équine. Ces modifications peuvent être liées à l'âge, à des facteurs génétiques ou à d'autres processus non inflammatoires. Le diagnostic d'ERU ne doit être posé qu'en présence d'inflammations intraoculaires **récidivantes** objectivées.

Possibilités de traitement

En cas de crises fréquentes ou difficiles à contrôler, des traitements chirurgicaux peuvent être indiqués :

- Injection intravitréenne de gentamicine à faible dose
- Vitrectomie par la pars plana lors d'ERU associée aux leptospires
- Implant de ciclosporine lors d'ERU d'origine génétique

Notre recommandation

En cas de suspicion d'ERU, une évaluation par un(e) vétérinaire ophtalmologue qualifié(e) (SAVO) est recommandée.

